

GRÖNGÖDSLINGSFÖRSÖK

Insådd i korn våren 2013. Odlingssäsong 2014 tas jordprover för kväveanalyser.

Grüngödslingsförsöket har tre olika vallfröblandningar; blåusern, rödklöver, klöver-gräs, som slås enligt plan 0-3 gånger/sommar. Syftet med grüngödslingsförsöket är att ta reda på om slåtterintensiteten har någon betydelse för baljväxternas kvävefixering till marken. Första jordproverna tagna 10.6.2014.

Slåtter 3 ggr (6.6. / ?.7./ ?.8.)	Slåtter 3 ggr (6.6. / ?.7./ ?.8.)	Slåtter 3 ggr (6.6. / ?.7./ ?.8.)
Slåtter 2 ggr (6.6. / ?.7.)	Slåtter 2 ggr (6.6. / ?.7.)	Slåtter 2 ggr (6.6. / ?.7.)
Slåtter 1 gång (6.6.2014)	Slåtter 1 gång (6.6.2014)	Slåtter 1 gång (6.6.2014)
KLÖVER-GRÄS Slåtter 0 ggr	KLÖVER Slåtter 0 ggr	BLÅLUCERN (Pondus) Slåtter 0 ggr

Nedan följer bilder från hösten 2013 samt våren 2014↓



Bilder 3.10.2014 Lucern anlagt under skyddssäd våren 2013





Bilder 3.10.2013, klöver anlagt under skyddssäd våren 2013





Bilder 3.10.2013, klöver-gräs anlagt under skyddssäd våren 2013





Upp: Lucern 26.5.2014 har övervintrat svagt.

Ner: Lucern 10.6.2014 nu är första slåttern gjord och första rutan i nedre kanten av bilden har lämnats orörd medan resten slagits av.





Upp: Klöver 26.5.2014

Ner: Klöver 10.6.2014, första slåttern nu gjord.





Upp: Klöver-gräs 26.5.2014. Till vänster fortsätter samma klöver gräsblandning som såatts på resten av skiftet runt de 3 observationsrutorna/ränderna.

Ner: Klöver-gräs 10.6.2014

